

Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – PODKÔRNY HMYZ

Činiteľ z Prílohy č. 2 Vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o LHE		Druh činiteľa	Drevina	Vek ohrozených porastov	Rojenie				Odchytové zariadenia												
názov	kód	[číslo fotografie]		[roky]	(závisí od podmienok prostredia a lokality)			Lapáky				Feromónové lapače									
					1.	2.	3.	Klasické (ležiacie)	stojace	Lapacie kopy (Hromady) ¹	otravené	Stupeň naletenia [počet závrto/dm ² /rojenie]			Odpárnik	Počet chrobákov v 1 m ²	Vzdialenosť od porastovej steny (stromu, dreva) [m]	Stupeň odchyty [počet chrobákov/lapač/rojenie]			
							Slabý					Stredný	Silný					Slabý	Stredný	Silný	
Lykožrút smrekový	LS	Lykožrút smrekový [1] <i>(Ips typographus)</i>	SM	nad 60	15. 4.	15. 6.	15. 8.	x	-	x	x	do 0,5	0,5-1	nad 1	IT Ecolure, Pheroprax A	40	10-25	do 1 000	1 000-4 000	nad 4 000	
Lykožrút lesklý	LL	Lykožrút lesklý [2] <i>(Pityogenes chalcographus)</i>	SM	nad 20	15. 4.	15. 6.	15. 8.	x	-	x	x	do 1	1-2	nad 2	PC Ecolure, Chalcooprax A	600	10-25	do 10 000	10 000-50 000	nad 50 000	
Drevokaz čiarokvaný	DC	Drevokaz čiarokvaný [3] <i>(Xyloterus lineatus)</i>	ihličnaté	nad 40	15. 3.	-	-	-	-	-	-	do 10 závrto/1 m	-	nad 10 závrto/1 m	XL Ecolure	170	15	do 2 000	-	nad 2 000	
Lykožrúty na jedlí	LJ	Lykožrút jedľový [4] <i>(Pityokteines curvidens)</i> , Lykožrút prostredný [5] <i>(Pityocteines spinidens)</i> , Lykožrút korunový [6] <i>(Pityocteines vorontzowi)</i>	JD	nad 40	15. 4.	1. 7.	-	x	-	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	
Podkôrníkovité na borovici	LB	Lykožrút vrcholcový [7] <i>(Ips acuminatus)</i>	BO	nad 40	15. 4.	1. 7.	-	x	-	x	-	do 5 závrto/1 m	5-20 závrto/1 m	nad 20 závrto/1 m	IAC Ecolure	-	10-25	-	-	-	
		Lykožrút borovicový [8] <i>(Ips sexdentatus)</i>	BO	nad 60	15. 4.	1. 7.	-	x	-	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	
		Lykokaz borinový [9] <i>(Tomiscus minor)</i>	BO	nad 40	15. 3.	-	-	-	x	-	x	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-
		Lykokaz borovicový [10] <i>(Tomiscus piniperda)</i>	BO	nad 60	15. 3.	-	-	-	x	-	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-
Lykožrút smrekovcový	LC	Lykožrút smrekovcový [11] <i>(Ips cembrae)</i>	SC	nad 60	15. 4.	1. 7.	-	x	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	-	
Podkôrník dubový	PD	Podkôrník dubový [12] <i>(Scolytus intricatus)</i>	DB	nad 40	1. 5.	-	-	-	x	x	-	do 0,5 materských chodieb	0,5-1 materských chodieb	nad 1 materských chodieb	-	-	-	-	-	-	
Iný podkôrný hmyz	PH	Lykožrút severský [13] <i>(Ips duplicatus)</i>	SM	nad 40	15. 4.	15. 6.	15. 8.	-	x	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	ID Ecolure	90	20-40	do 500	500-1 000	nad 1 000	
		Lykožrút smrečinový [14] <i>(Ips amitinus)</i>	SM	nad 40	15. 4.	15. 6.	-	x	-	x	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	
		Lykokaz matný [15] <i>(Polygraphus poligraphus)</i>	SM	nad 40	15. 4.	15. 6.	-	x	-	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	
		Lykokaz jaseňový [16] <i>(Leperisinus fraxini)</i>	JS	nad 10	15. 3.	-	-	-	x	-	x	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-

Poznámka: Lapacie kopy (Hromady)¹ - sú to kopy haluziny a korunových častí v porastoch (ťažbové zvyšky) alebo hromady na skladoch určené na štiepkovanie.

Táto karta je len schematickou pomôckou, ktorá zhrňuje informácie zo zákona o lesoch, príslušných vyhlášok, STN a odborných publikácií Lesníckej ochrannárskej služby.

Táto karta nesmie byť kopírovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu Lesníckej ochrannárskej služby Banská Štiavnica

Čiätacia: VAKULA, J., KUNCA, A., GALKO, J., GUBKA, A., ZUBRIK, M., RELL, S., LEONTOVIC, R., NIKOLOV, CH., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu - Podkôrný hmyz. Lesnícka ochrannárska služba, Banská Štiavnica, 2 str.

© Lesnícka ochrannárska služba Banská Štiavnica, 2015

