

# PREHĽAD ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV PRE LESNÚ HOSPODÁRSKU EVIDENCIU

## podkôrny hmyz

Činiteľ z Prílohy č. 2 Vyhľadky č. 297/2011 Z. z. o LHE		Druh činiteľa	Drevina	Vek ohro- zených porastov	Rojenie			Odchyťové zariadenia													
názov	kód	[číslo fotografie]		[roky]	(závisí od podmienok prostredia a lokality)			Lapáky						Feromónové lapáče							
					1.	2.	3.	Klasické (ležacie)	stojace	Lapacie kopy (Hromady) <sup>1</sup>	otrávené	Stupeň nateľenia (počet závrťov/dm <sup>2</sup> /rojenie)			Odparník	Počet chrobákov v 1 m	Vzdialenosť od porastovej steny (stromu, dreva) [m]	Stupeň odchyty (počet chrobákov/lapač/rojenie)			
												Slabý	Stredný	Silný				Slabý	Stredný	Silný	
Lykožrút smrekový	LS	Lykožrút smrekový [1] ( <i>Ips typographus</i> )	SM	nad 60	15. 4.	15. 6.	15. 8.	x	-	x	x	do 0,5	0,5-1	nad 1	IT Ecolure, Pheroprax A	40	10-25	do 1 000	1 000-4 000	nad 4 000	
Lykožrút lesklý	LL	Lykožrút lesklý [2] ( <i>Pityogenes chalcographus</i> )	SM	nad 20	15. 4.	15. 6.	15. 8.	x	-	x	x	do 1	1-2	nad 2	PC Ecolure, Chalcoprax A	600	10-25	do 10 000	10 000-50 000	nad 50 000	
Drevokaz čiarkovaný	DC	Drevokaz čiarkovaný [3] ( <i>Xyloterus lineatus</i> )	ihličnaté	nad 40	15. 3.	-	-	-	-	-	-	do 10 závrťov/1 m	-	nad 10 závrťov/1 m	XL Ecolure	170	15	do 2 000	-	nad 2 000	
Lykožrúty na jedli	LJ	Lykožrút jedľový [4] ( <i>Pityokteines curvidens</i> ), Lykožrút prostredný [5] ( <i>Pityocteines spinidens</i> ), Lykožrút korunový [6] ( <i>Pityocteines vorontzowi</i> )	JD	nad 40	15. 4.	1. 7.	-	x	-	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	
Podkôrníkovité na borovici	LB	Lykožrút vrcholový [7] ( <i>Ips acuminatus</i> )	BO	nad 40	15. 4.	1. 7.	-	x	-	x	-	do 5 závrťov/1 m	5-20 závrťov/1 m	nad 20 závrťov/1 m	IAC Ecolure	-	10-25	-	-	-	
		Lykožrút borovicový [8] ( <i>Ips sexdentatus</i> )	BO	nad 60	15. 4.	1. 7.	-	x	-	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	
		Lykokaz borinový [9] ( <i>Tomicus minor</i> )	BO	nad 40	15. 3.	-	-	-	x	-	x	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-
		Lykokaz borovicový [10] ( <i>Tomicus piniperda</i> )	BO	nad 60	15. 3.	-	-	-	x	-	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-
Lykožrút smrekovcový	LC	Lykožrút smrekovcový [11] ( <i>Ips cembrae</i> )	SC	nad 60	15. 4.	1. 7.	-	x	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	-	
Podkôrník dubový	PD	Podkôrník dubový [12] ( <i>Scolytus intricatus</i> )	DB	nad 40	1. 5.	-	-	-	x	x	-	do 0,5 materských chodieb	0,5-1 materských chodieb	nad 1 materských chodieb	-	-	-	-	-	-	
Iný podkôrny hmyz	PH	Lykožrút severský [13] ( <i>Ips duplicatus</i> )	SM	nad 40	15. 4.	15. 6.	15. 8.	-	x	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	ID Ecolure	90	20-40	do 500	500-1 000	nad 1 000	
		Lykožrút smrečínový [14] ( <i>Ips amitinus</i> )	SM	nad 40	15. 4.	15. 6.	-	x	-	x	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	
		Lykokaz matný [15] ( <i>Polygraphus poligraphus</i> )	SM	nad 40	15. 4.	15. 6.	-	x	-	-	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-	
		Lykokaz jaseňový [16] ( <i>Leperisinus fraxini</i> )	JS	nad 10	15. 3.	-	-	-	x	-	x	-	do 0,5	0,5-1	nad 1	-	-	-	-	-	-



→ orientácia požerku na strome

Poznámka: Lapacie kopy (Hromady)<sup>1</sup> – sú to kopy haluziny a korunových častí v porastoch (ťažbové zvyšky) alebo hromady na skladoch určené na štiepkovanie.

Autori: Vakula, J., Kunca, A., Gallo, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Rell, S., Leontovč, R., Nikolov, Ch.



Tento poster je len schematickou pomôckou, ktorá zhrňuje informácie zo zákona o lesoch, príslušných vyhlášok, STN a odborných publikácií Lesníckej ochrannárskej služby.

© Lesnícka ochrannárska služba Banská Štiavnica, 2015